

## §8.9 冪関数

定数  $p$  は実数とします. 前節で述べたように, 任意の正の実数  $x$  に対して  $x$  の  $p$  乗  $x^p$  の値が唯一つ定まります. 従って, 正の実数  $x$  に  $x$  の冪  $x^p$  を対応させると, この対応は関数になります. この関数  $x^p$  を, 指数が  $p$  である**冪関数**といいます.

例えば, 変数  $x$  について  $x > 0$  のとき,

$x$  の関数  $x^{-5}$  は指数が  $-5$  である冪関数で,  
 $x$  の関数  $x^{\frac{16}{3}}$  は指数が  $\frac{16}{3}$  である冪関数で,  
 $x$  の関数  $x^{\sqrt{7}}$  は指数が  $\sqrt{7}$  である冪関数です.

**例題** 定義域が区間  $[0, \infty)$  である冪関数  $f$  の指数が  $\frac{2}{3}$  であるとする. 125 における  $f$  の値及び  $\frac{7}{8}$  における  $f$  の値を求める.

冪関数  $f$  の指数が  $\frac{2}{3}$  なので,  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ .


$$f(125) = 125^{\frac{2}{3}} = (5^3)^{\frac{2}{3}} = 5^2 = 25.$$

$$f\left(\frac{7}{8}\right) = \left(\frac{7}{8}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{7^{\frac{2}{3}}}{(2^3)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7^{\frac{2}{3}}}{2^2} = \frac{7^{\frac{2}{3}}}{4}.$$


終

**問題 8.9.1** 関数  $f$  は  $\frac{3}{4}$  を指数とする冪関数であり, その定義域は区間  $[0, \infty)$  であるとします. 81 における  $f$  の値および  $\frac{11}{16}$  における  $f$  の値 49 における  $f$  の値を求めなさい.

定数  $p$  は実数で  $p \neq 0$  とします.  $p > 0$  のときの冪関数  $x^p$  ( $x \geq 0$ ) のグラフと  $p < 0$  のときの冪関数  $x^p$  ( $x > 0$ ) のグラフとは次のようになります.



$p > 0$  のときの  $y = x^p$  のグラフ



$p < 0$  のときの  $y = x^p$  のグラフ

グラフから分かるように次の定理が成り立ちます (証明は省略します).

**定理 8.9.1** 定数  $p$  は実数で  $p \neq 0$  とする.

$p > 0$  のとき, 区間  $[0, \infty)$  を定義域とする冪関数  $x^p$  は単調増加である.

$p < 0$  のとき, 区間  $(0, \infty)$  を定義域とする冪関数  $x^p$  は単調減少である.

0 以上の実数  $x$  について,  $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ ,  $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ . 従って, 上述の定理 8.9.1 より, 区間  $[0, \infty)$  を定義域とする関数  $\sqrt{x}$ ,  $\sqrt[3]{x}$  などは単調増加です.

冪関数の逆関数について次の定理が成り立ちます.

**定理 8.9.2** 定数  $p$  は実数で  $p \neq 0$  とする.

(1)  $p > 0$  のとき, 区間  $[0, \infty)$  を定義域とする冪関数  $x^p$  の逆関数は,  $[0, \infty)$  を定義域とする冪関数  $x^{\frac{1}{p}}$  である.

(2)  $p < 0$  のとき, 区間  $(0, \infty)$  を定義域とする冪関数  $x^p$  の逆関数は,  $(0, \infty)$  を定義域とする冪関数  $x^{\frac{1}{p}}$  である.

**証明** 項 (1) を証明する.  $p > 0$  とする.  $[0, \infty)$  を定義域とする冪関数  $f$  と  $g$  とを次のように定める:

$$f(x) = x^p \quad (x \geq 0), \quad g(x) = x^{\frac{1}{p}} \quad (x \geq 0)$$

$f$  の値域は区間  $[0, \infty)$  であり,  $g$  の定義域と一致する. また, 区間  $[0, \infty)$  の任意の実数  $x$  について, 指数法則より,

$$g(f(x)) = g(x^p) = (x^p)^{\frac{1}{p}} = x^{p \cdot \frac{1}{p}} = x^1 = x.$$

従って, 定理 7.6.4 より, 関数  $g$  は関数  $f$  の逆関数である. (証明終り)

このように, 冪関数の逆関数はやはり冪関数です.

**例題** 変数  $x$  について  $x \geq -\frac{9}{5}$  とする.  $x$  に関する方程式  $(5x+9)^{\frac{3}{4}} = 7$  を解く.

**【解説】**  $x \geq -\frac{9}{5}$  つまり  $5x+9 \geq 0$  である各実数  $x$  について

$$\left\{ (5x+9)^{\frac{3}{4}} \right\}^{\frac{4}{3}} = (5x+9)^1 = 5x+9.$$

方程式  $(5x+9)^{\frac{3}{4}} = 7$  の両辺を  $\frac{4}{3}$  乗する:

$$\left\{ (5x+9)^{\frac{3}{4}} \right\}^{\frac{4}{3}} = 7^{\frac{4}{3}},$$

$$5x+9 = 7^{\frac{4}{3}},$$

故に  $x = \frac{7^{\frac{4}{3}} - 9}{5}$ .

終

**問題 8.9.2** 変数  $x$  について  $x \geq \frac{3}{4}$  とします.  $x$  に関する方程式  $(4x-3)^{\frac{7}{5}} = 9$  を解きなさい.